

浙江椴树科及省沽油科三新变种

裘宝林 钟国荣

THREE NEW VARIETIES OF TILIACEAE AND
STAPHYLEACEAE FROM ZHEJIANG

Chiu Pao-lin Zhong Guo-rong

〔提要〕 本文发表了椴树科及省沽油科三新变种, 即长柄南京椴 *Tilia miqueliana* var. *longipes*, 绒果田麻 *Corchoropsis tomentosa* var. *tomentoscarpa* 及野鸦椿 *Euscaphis japonica* var. *pubescens*。

南京椴

Tilia miqueliana Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 26: 434 (1880); Rehd., Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2, 627 (1951); Steward, Man. Vasc. Pl. Lower Yangtze Vall. 247, fig. 231 (1958); 江苏植物志, 下册, 481, 图1526 (1982)。

(1) 南京椴 原变种

Var. *miqueliana*

本变种苞片几无柄或有短柄。

(2) 长柄南京椴 新变种

Var. *longipes* P. L. Chiu, var. nov.

Differt a varietate *miqueliana* petiolis bractearum multo longioribus, ad 1.1—2.2 cm longis.

Zhejiang (浙江): Anji (安吉), Xiaofeng (孝丰), Y. Y. Ho (贺贤育) 24348 (Typus! HZBG, 模式标本, 存杭州植物园标本室), Jun. 7 1957.

与原变种不同在其苞片柄漫长, 长达 1.1—2.2 厘米。

田麻

Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII: 11 (1903). — *Corchorus tomentosus* Thunb., Fl. Jap. 228 (1784); Ohwi, Fl. Jap. 765 (1956); Fl. Pl. Herb. Chinae Boreali-Orient. Tom. 6: 60 (1977);

本文作者工作单位: 浙江, 杭州植物园 (Hangzhou Botanical Garden, Zhejiang).

Makino, Makino's New Illustr. Fl. Jap. 364, fig. 1534 (1979). — *Corydalis crenata* Sieb. et Zucc. in Adh. Phys.-Math. Akad. Wiss. Muench. III, 3: 738, t. 4. h 1—14 (1843), et IV, 2: 164 (1845).

(1) 田麻 原变种

var. *tomentosa*

经仔细查考, 本变种模式标本采自日本, 其子房和幼果密被星状毛及柔毛, 组成成熟蒴果只散生星状毛。

(2) 绒毛田麻 新变种

var. *tomentosicarpa* P. L. Chiu et G. R. Zhong, var. nov.

Differt a varietate *tomentosa* capsulis dense stellate breviter cinereo-tomentosis.

Zhejiang (浙江): Hangzhou (杭州), Feilaifeng (飞来峰), S. Y. Chang (章绍尧) 1228 (Typus: HZBG, 模式标本, 存杭州植物园标本室), Sep. 26 1958; Hangzhou (杭州), Yuhuangshan (玉皇山), Hangzhibiao (杭植标) 1169, Sep. 27 1979; Hangzhou (杭州), Baoshishan (宝石山), C. C. Wu (吴长春) 611, Dongtou (洞头), B. S. Zheng (郑保生) 50, Oct. 10 1960.

与原变种不同在其蒴果密被灰色星状短绒毛。

野鸦椿

Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz in Természetr. Füzet. 3: 157 (Anthoph. Jap. 24) (1878); Dippel, Handb. Laubh. 2: 480 (1892); Rehd., et wils. in Sargent, Pl. wilson. 2: 187 (1915); Rehd., Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2, 565 (1951); Ohwi, Fl. Jap. 742 (1956), cum descr. Jap.; Steward, Man. Vasc. Pl. Lower Yangtze Vall. 226, fig. 217 (1958); 中国高等植物图鉴 2: 690, 图 3109 (1972); Makino, Makino's New Illustr. Fl. Jap. 364, fig. 1455 (1979); 云南植物志 2: 354, 图版 110, 8—11 (1979); 中国植物志 46: 24, 图版 6 (1981); 江苏省植物志, 下册, 446, 图 1466 (1982). — *Sambucus japonica* Thunb., Fl. Jap. 125 (1784). — *Euscaphis japonica* (Thunb.) Kanitz var. *ternata* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 3: 215 (1922).

(1) 野鸦椿 原变种

var. *japonica*

本变种小枝、叶柄、叶轴、小叶柄及花序均无毛, 小叶仅下面沿中脉有柔毛。

(2) 毛野鸦椿 新变种

var. *pubescens* P. L. Chiu et G. R. Zhong, var. nov.

Ramulis conspicue dense pubescentibus vel raro postremo subglabris; petiollis, rachidibus foliorum, petiolulis, inflorescentis et foliolis (praesertim subtus) quaecumque conspicue dense pubescentibus. Ceterum ut in var. *japonica*.

Zhejiang (浙江): Jiande (建德), Baisha (白沙), L. Hong (洪林), 532, Sep. 15 1980

et 1128 (Typus! HZBG, 模式标本, 存杭州植物园标本室), May 31 1981.

Gansu (甘肃): Wenxian (文县), Bikou (碧口), Z. P. Wei (魏志平) 3292, Oct. 20 1958.

小枝明显密被柔毛或很少最后近无毛; 叶柄、叶轴、小叶柄、花序以及小叶片 (尤其下面) 均明显地密被宿存柔毛。其余与原变种相同。

_____ . . . _____